

TITRE X – LISTE DES ESSENCES LOCALES PRECONISEES

Liste des essences locales de Seine-Maritime recommandées par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine-Normande :

CATALOGUE des ESSENCES LOCALES recommandées pour la plantation

CONSEIL PRATIQUE Pour assurer une bonne reprise de vos plants, les premiers critères de choix doivent être l'adaptation au sol et l'exposition. Le caractère esthétique doit ensuite être adapté en fonction de ces premiers critères.

Nom Français	Nom latin	Feuillage	Type de haie	Exposition	Sol	PH	Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Méllifère	Toxicité
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i>							1-2	10		Automne				
Aisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>							15-20	50 à 130						
Aiguier	<i>Hippophae rhamnoides</i>							2-3	50						
Aubépine blanche**	<i>Crataegus monogyna</i>							2-10	500		Ap. flo				
Aubépine griffée	<i>Crataegus 'Paul's Scarlet'</i>							2-10			Ap. flo				
Aune à feuilles en cœur	<i>Alnus cordata</i>							10-20							
Aune glutineuse	<i>Alnus glutinosa</i>							15-25	50 à 100						
Bouleau verticillé	<i>Betula pendula</i>							20-25	100						
Bourdaie	<i>Fraxino alba</i>							1-5							
Buis toujours vert	<i>Buxus sempervirens</i>							0,5-2	100 à 600						
Catais	<i>Ribes nigrum</i>							1-2							
Coisier à grappes	<i>Fraxino pedis</i>							5-10	50						
Coisier de sainte-Luce	<i>Fraxino melleo</i>							4-12	50						
Charme commun (chumelle)	<i>Carpinus betulus</i>							10-25	100 à 150						
Châtaignier commun	<i>Castanea sativa</i>							20-25	500 à 1500						
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>							25-35	400 à 1000						
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>							20-40	500 à 1000						
Chevreuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>							4-6	10						
Comoulier mâle	<i>Cornus mas</i>							2-6	300						
Comoulier sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>							2-5	30						
Deutzia	<i>Deutzia magnifica</i>							2-3			Ap. flo				
Égayeron commun	<i>Rosa canina</i>							1-5	+ de 50		Hiver				
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>							12-15	150						
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>							20-30	200						
Érable syrocarpe	<i>Acer pseudoplatanus</i>							20-30	300 à 500						
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>							1-2							
Frêne commun	<i>Fraxino excelsior</i>							20-30	150 à 200						
Fusain d'Europe	<i>Eucalyptus europaeus</i>							2-6	50		Hiver				
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>							1-3	10 à 25		Ap. flo				
Grosselier à fleurs	<i>Ribes sanguineum</i>							1,75			Ap. flo				
Grosselier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i>							0,60 - 1,20							
Grosselier fruits	<i>Ribes rubrum</i>							1,5-2							
Hêtre vert	<i>Fagus sylvatica</i>							30-40	150 à 300						
Hêtre pourpre	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>							30-40	150 à 300						
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>							2-10	300						

** Disponible uniquement sur présentation d'une dérogation de plantation délivrée par la DRAAF.

LÉGENDE

- Feuillage caduc
- Feuillage persistant
- Feuillage semi-persistant
- Feuillage transescent
- Haie caudex
- Haie simple
- Haie vive / fleurie
- Pelit et moyen brise-vent
- Garç brise-vent
- Sujet isolé
- Écoarçement, bande isolée
- Riscopage possible
- Vitesse de croissance lente
- Vitesse de croissance moyenne
- Vitesse de croissance rapide
- Floraison (couleur et période)
- Fructification (couleur et période)
- Plante / fruit toxique
- Plante / fruit légèrement toxique
- Fruit comestible
- Méllifère : plante sécrétant le nectar transmissible aux abeilles pour faire du miel

Nom Français	Nom Latin	Feuille	Type de haie	Exposition		Sol		pH	Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Mellifère	Toxicité
				Ombre	Membre	Sable	Humide										
If commun	<i>Taxus baccata</i>									15-20	1 000			III	VX		
Lierre	<i>Hedera helix</i>									L=30				IX-X	III-IV		
Lilas sauvage	<i>Syringa vulgaris</i>									4-6			Ap flo				
Nerisier	<i>Prunus avium</i>									15-25	100						
Néflier	<i>Mespilus germanica</i>									2-4	50-150						
Nerprun rugueux	<i>Rhamnus cathartica</i>									2-5							
Noisetier coudrier	<i>Corylus avellana</i>									2-4	30 à 60						
Noisetier ponceur	<i>Prunus spinosa</i>									2-4	30 à 60						
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>									20-25	300 à 400						
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>									10-35	400 à 500						
Orme résilient	<i>Ulmus lancea 'Narguen'</i>									10-35	400 à 500						
Pivoine	<i>Paeonia</i>									0,25-0,50							
Peuplier noir (NRA) <i>actuellement indisponible</i>	<i>Populus nigra</i>									25-30	>=400						
Poirier sauvage	<i>Pyrus pyraster</i>									10-15	200						
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>									5-12	70 à 100						
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>									1-4	50-80						
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>									8							
Saule blanc	<i>Salix alba</i>									2-20	300						
Saule coudré	<i>Salix omora</i>									2-4	30						
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>									2-10	50-60						
Saule pourpe	<i>Salix purpurea</i>									1-4	50						
Saule des vaniers	<i>Salix viminalis</i>									3-10	50						
Seringat	<i>Philadelphus coronatus</i>									2,50			Ap flo				
Sorrier domestique - Comier	<i>Sorbus domestica</i>									5-20	500						
Sorrier des dieux	<i>Sorbus aucuparia</i>									10-20	120 à 150						
Spirée de Douglas	<i>Spiraea douglasii</i>									1,50-2			Hiver				
Spirée de Vanhoutte	<i>Spiraea x vanhouttei</i>									1,50-2			Hiver				
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>									2-15	50 à 100						
Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i>									1-3			Hiver				
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>									20-35	500						
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>									20-30	500						
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>									2-3							
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>									1-3	30 à 50		Ap flo				
Viorne saubier	<i>Viburnum opulus</i>									2-4	20 à 30		Ap flo				

Liste des essences invasives interdites pour une haie recommandée par le PNRBSN



Liste des espèces invasives (Liste_EEE_HN_2012)

Nom latin	Nom français
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule
<i>Acer negundo</i> L.	Érable négondo
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Sagittaire à larges feuilles
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier tardif
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Lev.	Berce du Caucase
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle fausse-renoncule
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén et St John	Lysichiton américain
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie annuelle
<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. et A. Gray	Ambrosie vivace
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Aster lancéolé
<i>Aster salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharis à feuilles d'arroche ; Sénéçon en arbre
<i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd.	Bident soudé
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>anomala</i> Porter ex Fernald	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>frondosa</i>	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Conyza bilbaoana</i> J. Rémy	Vergerette de Bilbao
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Vergerette de Sumatra
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Inule fétide
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Sénéçon du Cap
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada ; Gerbe d'or
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balsamine de Balfour
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Alysson blanc
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddléia de David ; Arbre aux papillons
<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corispeme à fruits ailés
<i>Comus sericea</i> L.	Comouiller soyeux
<i>Crassula helmsii</i> (T. Kirk) Cock.	Crassule de Helms ; Orpin des marais

<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron des parcs
<i>Euphorbia x pseudovirgata</i> (Schur) Soó	Euphorbe fausse-baguettes
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Cytise faux-ébénier ; Aubour
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil
<i>Egeria densa</i> Planch.	Égérie dense
<i>Elodea callitrichoides</i> (L.C.M. Rich.) Caspary	Élodée fausse-callitriche
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Élodée de Nuttall
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Lagarosiphon
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lentille d'eau minuscule
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau à turions
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Jussie à grandes fleurs
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Ludwigie fausse-péplide (s.l.)
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Ludwigie de Montevideo ; Jussie fausse-péplide
<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn.	Herbe de la Pampa
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles rudes
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>brevipila</i>	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>multinervis</i> (Stohr) Dengler	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchc.	Glycérie striée
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino	
<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard	Spartine anglaise
<i>Spartina x townsendii</i> H. et J. Groves	Spartine de Townsend
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene	Renouée du Japon
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene var. <i>japonica</i>	Renouée du Japon (var.)
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Renouée de Sakhaline
<i>Fallopia x bohemica</i> (Chrtk et Chrtková) J.P. Bailey [Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene x Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene]	Renouée de Bohême
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Spirée à feuilles de saule
<i>Mimulus guttatus</i> DC.	Mimule tacheté
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux
<i>Datura stramonium</i> L.	Stramoine commune
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Stramoine commune (var.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Hupke	Stramoine commune (f.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>stramonium</i>	Stramoine commune (f.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>fatula</i> (L.) Torr.	Stramoine commune (var.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>fatula</i> (L.) Torr. f. <i>fatula</i> (L.) Danert	Stramoine commune (f.)
<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet commun
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Staphyléier penné ; Faux-pistachier
<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vigne-vierge commune