TITRE V

LISTE DES VEGETAUX D'ESSENCES LOCALES
Source PNR

LISTE des ESSENCES VÉGÉTALES recommandées pour la plantation

CONSEIL PRATIQUE Pour assurer une bonne reprise de vos plants, les premiers critères de choix doivent être l'adaptation au sol et l'exposition. Le caractère esthétique doit ensuite être adapté en fonction de ces premiers critères.

Nom Français	Nom latin	Feuillage	Type de haie	Exposition			Sol (de très sec à très humide)					PH (de très acide à très calcaire)					Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Mellifère	Toxicité
				Ombre	Mi-ombre	Soleil	- -	-	0	+	+ +	- -	-	0	+	+ +									
Ajonc d'Europe	*Ulex europaeus*																Sols pauvres, siliceux, limoneux, sains, filtrants	1 - 2	10		Automne	II-VI VIII-X			
Alisier torminal	*Sorbus torminalis*																Argileux, siliceux, calcaires	15 - 20	90 à 130			V	VII-IX		
Argousier	*Hippophae rhamnoides*																Sableux à graveleux	2 - 3	50			VI-VII	IX-X		
Aubépine blanche**	*Crataegus monogyna*																Argileux, limoneux, calcaire	2 - 10	500		Ap flo	V	VI-IX		
Aubépine greffée	*Crataegus 'Pauls' Scarlet'*																Argileux, limoneux, calcaire	2 - 10			Ap flo	V	VI-IX		
Aulne à feuilles en cœur	*Alnus cordata*																Argileux à peu sableux	10 - 20				III-IV			
Aulne glutineux	*Alnus glutinosa*																Argileux à peu sableux	15 - 25	60 à 100			III-IV			
Bouleau verruqueux	*Betula pendula*																Pauvres, modérément pauvres, sableux, limoneux caillouteux	20 - 25	100			IV-V			
Bourdaine	*Frangula alnus*																Surtout argileux ou tourbeux, parfois acides	1 - 5				V	VIII-IX		
Buis toujours vert	*Buxus sempervirens*																Bonne terre de jardin	0,5 - 2	100 à 600			III-IV			
Cassis	*Ribes nigrum*																Sols riches, argileux, limoneux, humifère	1 - 2				IV-V	VIII		
Cerisier à grappes	*Prunus padus*																Siliceux, argileux, limoneux	5 - 10	50			V-VI	VIII-IX		
Cerisier de sainte-Lucie	*Prunus malaheb*																Sable	4 - 12	50			IV			
Charme commun (charmille)	*Carpinus betulus*																Alluviaux, argileux, limoneux, + ou - caillouteux, + ou - profonds	10 - 25	100 à 150			IV-V			
Châtaignier commun	*Castanea sativa*																Siliceux, légers, pierreux	20 - 25	500 à 1 500			VI	X-XI		
Chêne pédonculé	*Quercus robur*																Argileux, limoneux, sableux voire tourbeux	25 - 35	400 à 1 000			IV-V	VIII-XI		
Chêne sessile	*Quercus petraea*																Argileux, limoneux, sablonneux	20 - 40	500 à 1 000			V-VI	VIII - XI		
Chèvrefeuille des bois	*Lonicera periclymenum*																Siliceux, frais, humide	4 - 6	10			V-VII	VIII-X		
Cornouiller mâle	*Cornus mas*																Argileux, limoneux	2 - 6	300			II-III	IV-IX		
Cornouiller sanguin	*Cornus sanguinea*																Argileux, limoneux, profonds	2 - 5	30			V-VII	IX-I		
Deutzia	*Deutzia magnifica*																Argileux, limoneux	2 - 3			Ap flo	VI			
Églantier commun	*Rosa canina*																Argileux, limoneux	1 - 5	+ de 50		Hiver	V-VII	IX-XII		
Érable champêtre	*Acer campestre*																Sols riches	12 - 15	150			IV-V			
Érable plane	*Acer platanoides*																Argileux, limoneux, profonds et frais	20 - 30	200			IV-V			
Érable sycomore	*Acer pseudoplatanus*																Sols limoneux et aéré	20 - 30	300 à 500			V			
Framboisier	*Rubus idaeus*																Argiles, limons, sables, humus	1 - 2				V-VIII	VIII-IX		
Frêne commun	*Fraxinus excelsior*																Sols alluviaux limoneux à argileux, humifères, légers	20 - 30	150 à 200			IV			
Fusain d'Europe	*Euonymus europaeus*																Limoneux à argileux, + ou - caillouteux, parfois sableux	2 - 6	50		Hiver	IV-V	VIII-IX		
Genêt à balais	*Cytisus scoparius*																Sableux à limoneux, + ou - caillouteux	1 - 3	10 à 25		Ap flo	V-VII			
Groseillier à fleurs	*Ribes sanguineum*																Argileux, limoneux	1,75			Ap flo	IV-V			
Groseillier à maquereaux	*Ribes uva-crispa*																Argileux, limoneux	0,60 - 1,20				IV-V	VIII		
Groseillier fruits	*Ribes rubrum*																Argileux, limoneux	1,5 - 2				IV-V	VIII		
Hêtre vert	*Fagus sylvatica*																Pauvres à assez riches, surtout limoneux, nécessitent de fortes précipitations	30 - 40	150 à 300			IV-V	VIII-X		
Hêtre pourpre	*Fagus sylvatica 'Purpurea'*																Pauvres à assez riches, surtout limoneux, nécessitent de fortes précipitations	30 - 40	150 à 300			IV-V	VIII-X		
Houx	*Ilex aquifolium*																Limoneux, argileux, sableux	2 - 10	300			V-VI	X-XII		

LÉGENDE

- Plante couvre-sol
- Haie taillée
- Haie vive / fleurie
- Petit et moyen brise-vent
- Grand brise-vent
- Sujet isolé
- Boisement, bande boisée
- Haie cauchoise
- Arbre têtard
- Recépage possible
- Feuillage caduc
- Feuillage persistant
- Feuillage semi-persistant
- Feuillage marcescent
- Vitesse de croissance lente
- Vitesse de croissance moyenne
- Vitesse de croissance rapide
- Floraison (couleur et période)
- Fructification (couleur et période)
- Plante / fruit toxique
- Plante /fruit légèrement toxique
- Fruit comestible
- Mellifère : plante secrétant le nectar nécessaire aux abeilles pour faire du miel

Nom Français	Nom latin	Feuillage	Type de haie	Exposition			Sol (de très sec à très humide)					PH (de très acide à très calcaire)					Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Mellifère	Toxicité
				Ombre	Mi-ombre	Soleil	- -	-	0	+	+ +	- -	-	0	+	+ +									
If commun	*Taxus baccata*																Argileux, limoneux, sablonneux, humifères, léger	15 - 20	1 000			II-III	V-X		
Lierre	*Hedera helix*																Sols sableux, caillouteux avec argiles, limons, humifères	L => 30				IX-X	III-IV		
Lilas sauvage	*Syringa vulgaris*																Sols ordinaires, profonds, riches, frais mais bien drainés	4 - 6			Ap flo	IV-VI			
Merisier	*Prunus avium*																Assez riches, argileux, limoneux, profonds	15 - 25	100			IV-V	VII-X		
Néflier	*Mespilus germatica*																Sols pauvres à modérément pauvres, limoneux ou sableux	2 - 4	50 - 150			V-VI	VIII-XI		
Nerprun purgatif	*Rhamnus cathartica*																Crayeux, sableux, argileux, caillouteux	2 - 5				V-VI	VIII-IX		
Noisetier coudrier	*Corylus avellana*																Argileux, limoneux, humifères	2 - 4	30 à 60			I-III	IX		
Noisetier pourpre	*Corylus avellana 'Purpurea'*																Argileux, limoneux, humifères	2 - 4	30 à 60			I-III	IX		
Noyer commun	*Juglans regia*																Argileux, limoneux, caillouteux, frais	20 - 25	300 à 400			IV-V	IX-X		
Orme champêtre	*Ulmus minor*																Sols riches, alluviaux, argileux, limoneux voire sableux	10 - 35	400 à 500			III-IV			
Orme résistant	*Ulmus Lutece 'Nanguen'*																Sols riches, alluviaux, argileux, limoneux voire sableux	10 - 35	400 à 500			III-IV			
Pervenche	*Vinca*																Terres fraiches mais drainantes	0,25 - 0,50				V-IX			
Peuplier noir (INRA) *actuellement indisponible*	*Populus nigra*																Limons, sables, alluvions	25 - 30	=> 400			III-IV			
Poirier sauvage	*Pyrus pyraster*																Argileux, limoneux	10 - 15	200			IV-V	VIII-IX		
Pommier sauvage	*Malus sylvestris*																Argileux, limoneux, profonds	5 - 12	70 à 100			IV-V	VIII-X		
Prunellier	*Prunus spinosa*																Limoneux, argileux ou crayeux, + ou - caillouteux, rarement sableux	1 - 4	50 - 80			IV	VIII-X		
Prunier myrobolan	*Prunus cerasifera*																Argileux, limoneux, sableux, humifère, léger	8				IV-V	VIII-IX		
Saule blanc	*Salix alba*																Argileux, limoneux, sableux	2 - 20	300			IV-V			
Saule cendré	*Salix cinerea*																Sols tourbeux, humides	2 - 4	30			IV-V			
Saule marsault	*Salix caprea*																Argileux, limoneux, sablonneux	2 - 10	50 - 60			III-IV			
Saule pourpre	*Salix purpurea*																Drainé	1 - 4	50			III-IV			
Saule des vanniers	*Salix viminalis*																Galets, sables, limons..	3 - 10	50			IV-V			
Seringat	*Philadelphus coronarius*																S'adapte à la plupart des sols	2,50			Ap flo	V-VI			
Sorbier domestique : Cormier	*Sorbus domestica*																Argileux à calcaire	5 - 20	500			IV-VI	VIII-X		
Sorbier des oiseleurs	*Sorbus aucuparia*																Pauvres, à modérément pauvres, sableux, limoneux	10 - 20	120 à 150			V-VI	VIII-IX		
Spirée de Douglas	*Spiraea douglasii*																Sols non calcaire, légers et frais	1,50 - 2			Hiver	VII-VIII			
Spirée de Vanhoutte	*Spiraea x vanhouttei*																Bonne terre de jardin	1,50 - 2			Hiver	VI-VII			
Sureau noir	*Sambucus nigra*																Argileux, limoneux, légers	2 - 15	50 à 100			VI-VII	IX-X		
Symphorine blanche	*Symphoricarpus albus*																Sols ordinaires bien drainés	1 - 3			Hiver	VI-IX	IX-XI		
Tilleul à grandes feuilles	*Tilia platyphyllos*																Sols riches, argileux, limoneux, sur éboulis ou substrats	20 - 35	500			VI-VII			
Tilleul à petites feuilles	*Tilia cordata*																Sols pauvres à assez riches, argileux, limoneux	20 - 30	500			VI-VII			
Troène commun	*Ligustrum vulgare*																Caillouteux, limoneux, sableux, argileux, humus	2 - 3				V-VI	VII-X		
Viorne lantane	*Viburnum lantana*																Sols pauvres à modérement riches, argileux, limoneux, alluvions	1 - 3	30 à 50		Ap flo	V-VI	VII-X		
Viorne aubier	*Viburnum opulus*																Sols marneux, argileux, limoneux	2 - 4	20 à 30		Ap flo	V-VI	VII-XII		

LÉGENDE

- Plante couvre-sol
- Haie taillée
- Haie vive / fleurie
- Petit et moyen brise-vent
- Grand brise-vent
- Sujet isolé
- Boisement, bande boisée
- Haie cauchoise
- Arbre têtard
- Recépage possible
- Feuillage caduc
- Feuillage persistant
- Feuillage semi-persistant
- Feuillage marcescent
- Vitesse de croissance lente
- Vitesse de croissance moyenne
- Vitesse de croissance rapide
- Floraison (couleur et période)
- Fructification (couleur et période)
- Plante / fruit toxique
- Plante /fruit légèrement toxique
- Fruit comestible
- Mellifère : plante secrêtant le nectar nécessaire aux abeilles pour faire du miel